

Gebrauchsinformation - bitte aufmerksam lesen

## **Antinicoticum mono**

**Wirkstoff: Lobelia inflata D6 dil.**

**Homöopathisches Arzneimittel**

**Zur Anwendung bei Erwachsenen**

**Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, denn sie enthält wichtige Informationen für Sie.**

**Dieses Arzneimittel ist ohne Verschreibung erhältlich. Um einen bestmöglichen Behandlungserfolg zu erzielen, muß Antinicoticum mono jedoch vorschriftsmäßig angewendet werden.**

**Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.**

**Fragen Sie Ihren Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.**

**Wenn sich Ihre Symptome verschlimmern oder keine Besserung eintritt, müssen Sie auf jeden Fall einen Arzt oder Heilpraktiker aufsuchen.**

**Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, informieren Sie bitte Ihren Arzt oder Apotheker.**

**Diese Packungsbeilage beinhaltet:**

1. Was ist Antinicoticum mono und wofür wird es angewendet?
2. Was müssen Sie vor der Einnahme von Antinicoticum mono beachten?
3. Wie ist Antinicoticum mono einzunehmen?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie ist Antinicoticum mono aufzubewahren?
6. Weitere Informationen

### **1. Was ist Antinicoticum mono und wofür wird es angewendet?**

Antinicoticum mono ist ein registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. Bei während der Anwendung des Arzneimittels fortdauernden Krankheitssymptomen ist medizinischer Rat einzuholen.

### **2. Was müssen Sie vor der Anwendung von Antinicoticum mono beachten?**

Antinicoticum mono darf nicht eingenommen werden, wenn Sie überempfindlich (allergisch) gegen einen der arzneilich wirksamen oder der sonstigen Bestandteile von Antinicoticum mono sind.

Das Arzneimittel soll bei Alkoholkranken nicht angewendet werden. Bei Leberkranken sollte das Arzneimittel nur nach Rücksprache mit einem Arzt eingenommen werden.

#### **Kinder**

Zur Anwendung dieses Arzneimittels bei Kindern liegen keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vor. Es soll deshalb bei Kindern unter 12 Jahren nicht angewendet werden.

#### **Schwangerschaft und Stillzeit**

Da keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen zur Anwendung in der Schwangerschaft und Stillzeit vorliegen, sollte das Arzneimittel nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.

#### **Bei Einnahme von Antinicoticum mono mit anderen Arzneimitteln:**

Bitte informieren Sie Ihren Arzt oder Heilpraktiker, wenn Sie andere Arzneimittel einnehmen bzw. vor kurzem eingenommen haben, auch wenn es sich um nicht verschreibungspflichtige Arzneimittel handelt.

#### **Wichtige Informationen über bestimmte sonstige Bestandteile von Antinicoticum mono :**

Dieses Arzneimittel enthält 50 Vol.-% Alkohol.

### **3. Wie ist Antinicoticum mono einzunehmen?**

Nehmen Sie Antinicoticum mono immer genau nach der Anweisung in dieser Packungsbeilage ein. Bitte fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht ganz sicher sind.

Die folgenden Angaben gelten, soweit Ihnen der Arzt Antinicoticum mono nicht anders verordnet hat. Bitte halten Sie sich an die Anwendungsvorschriften, da Antinicoticum mono sonst nicht richtig wirken kann!

Als Faustregel gilt in der Homöopathie bei akuten Zuständen eine Einnahme in kurzen Zeitabständen, während bei chronischen Erkrankungen die Einnahmeabstände länger sein können.

Soweit nicht anders verordnet, bei akuten Zuständen alle halbe bis ganze Stunde, höchstens 6x täglich, je 5 Tropfen einnehmen.

Eine über eine Woche hinausgehende Anwendung sollte nur nach Rücksprache mit einem homöopathisch erfahrenen Therapeuten erfolgen.

Bei chronischen Verlaufsformen 1 bis 3 mal täglich jeweils 5 Tropfen einnehmen.

Bei Besserung der Beschwerden ist die Häufigkeit der Einnahme zu reduzieren.

Die Tropfen können unverdünnt oder auf einem Teelöffel mit Wasser verdünnt eingenommen und einige Zeit im Mund belassen werden, bevor sie geschluckt werden. Die Einnahme ist unabhängig von den Mahlzeiten. Zur korrekten Dosierung ist die Flasche beim Tropfen schräg in einem Winkel von etwa 45° zu halten.

#### **Wie lange sollten Sie Antinicotinum mono einnehmen?**

Die Wirkungsdauer einer Arzneimittelgabe kann individuell verschieden sein. Wenden Sie sich daher bei Fragen zur Dauer der Anwendung an Ihren Arzt. Halten Sie sich auch dann an die Anwendungsvorschriften, wenn Sie sich bereits nach kürzerer Zeit besser fühlen. Auch homöopathische Medikamente sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.

#### **Wenn Sie eine größere Menge Antinicotinum mono eingenommen haben, als Sie sollten**

Von den homöopathischen Bestandteilen sind keine Vergiftungserscheinungen zu erwarten. Bei Einnahme von sehr großen Mengen ist jedoch der Alkoholgehalt zu berücksichtigen.

Bei der Einnahme des gesamten Flascheninhalts einer 100 ml Packung werden bis zu 42 g Alkohol aufgenommen. Dies kann, insbesondere bei Kleinkindern, zu einer Alkoholvergiftung führen, die sich zunächst in Erregung, später in Krämpfen und Bewußtlosigkeit äußert; in diesem Fall besteht Lebensgefahr durch Atemlähmung, weshalb unverzüglich ein Arzt aufzusuchen ist.

Wenn Sie weitere Fragen zur Anwendung des Arzneimittels haben, fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.

#### **4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?**

Keine bekannt.

Hinweis:

Bei der Anwendung eines homöopathischen Arzneimittels können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen.

Informieren Sie bitte Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie Nebenwirkungen bemerken.

#### **5. Wie ist Antinicotinum mono aufzubewahren?**

Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Sie dürfen das Arzneimittel nach dem auf dem Flaschenetikett und der Faltschachtel angegebenen Verfalldatum nicht mehr verwenden. Das Verfalldatum bezieht sich auf den letzten Tag des Monats.

#### **Aufbewahrungsbedingungen:**

In der Originalverpackung aufbewahren.

#### **6. Weitere Informationen**

10 g enthalten an Wirkstoff:  
Lobelia inflata D6 dil. 10,0 g

Enthält 50 Vol.-% Alkohol.

#### **Inhalt der Packung:**

Tropfflasche mit 30 ml (N1) Mischung  
Tropfflasche mit 100 ml (N2) Mischung

#### **Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller**

pharmarissano Arzneimittel GmbH  
Haldenweg 5 a  
67278 Bockenheim  
Tel.: 06359 – 949240  
Fax: 06359 - 949241

Diese Gebrauchsinformation wurde zuletzt im Mai 2013 überarbeitet.